

Elk geneesmiddel op het juiste moment!



Een overzicht

Antidiabetica

-  **gliniden** (*repaglinide*) 15 tot maximaal 30 minuten vóór de hoofdmaaltijd
-  **metformine** vermijd overmatig alcoholgebruik
-  **oraal semaglutide** na een nuchtere periode van minstens 8 uur; met maximaal 120 ml vloeistof; wacht 30 minuten met inname van eten, drinken of een ander geneesmiddel
-  **langwerkende hypoglykemiërende sulfamiden** (*gliclazide* met gereguleerde afgifte en *glimepiride*) meestal bij het ontbijt

Anti-infectieuze middelen

-  **amoxicilline + clavulaanzuur**
-  **flucloxacilline** 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd
-  **fluorochinolonen** *ciprofloxacin* en *levofloxacin*: wacht 2 uur met melkproducten, aluminium-, ijzer-, calcium- en magnesiumzouten; *moxifloxacin*: wacht 6 uur
-  **fosfomycine** 2 tot 3 uur vóór of na de maaltijd, bij voorkeur vlak voor het slapengaan, na het legen van de blaas
-  **itraconazol** inname met een zure drank indien verminderd maagzuur
-  **ivermectine** minstens 2 uur vóór of na een maaltijd
-  **metronidazol** alcohol vermijden tot minstens 24 uur na het stoppen
-  **nitrofurantoïne**
-  **rifampicine** 30 min vóór of 2 uur na een maaltijd
-  **tetracyclines** (*doxycycline*, *lymecycline*, *minocycline*) liefst 1 uur vóór of 2 uur na maaltijd; tijdens eten bij maaglast; zittend innemen, geheel met veel vloeistof; enkele uren interval bij aluminium-, ijzer-, calcium- en magnesiumzouten



Bij de maaltijd



Tussen de maaltijden



(‘s Ochtends) op een lege maag

Elk geneesmiddel op het juiste moment!

Een overzicht



Andere geneesmiddelen

-  **NSAID's** met een maaltijd om het risico op maagirritatie te verminderen
-  **azathioprine** altijd op dezelfde manier (met/zonder voedsel), 1 uur vóór of 3 uur na inname van melkproducten
-  **bilastine** 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd of fruitsap
-  **bisfosfonaten** wacht 30 tot 60 minuten met inname van voedsel, drank, calcium, antacida of andere geneesmiddelen; zittend, in hun geheel, met een glas (calciumarm en niet-bruisend) water innemen
-  **ijzer** liefst 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd; tijdens de maaltijd bij maaglast; wacht 2 tot 3 uur met inname van bepaalde andere geneesmiddelen
-  **protonpompinhibitoren** + 30 minuten na inname een maaltijd nemen
-  **levothyroxine** liefst 30 tot 60 minuten vóór het ontbijt, koffie, melk- of sojaproducten; inname 's avonds minstens 3 uur na het avondeten is mogelijk; 3 tot 4 uur vóór of na inname van ijzer, magnesium, calcium of antacida
-  **melatonine met normale afgifte** 2 uur vóór of na een maaltijd (minstens 3 uur bij belangrijke glucose-intolerantie of diabetes)



Bij de maaltijd



Tussen de maaltijden



(‘s Ochtends) op een lege maag